

CAMPI D'IMPIEGO

K-OTHRINE® FLOW 7,5 si impiega per la lotta contro mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici, tarne, parassiti del legno, ragni e insetti che infestano abitazioni e magazzini. E' efficace in modo rapido e duraturo contro gli insetti sopraportati all'esterno e all'interno di tutti gli ambienti, come ad esempio:

- abitazioni, scuole, ospedali, caserme, cinema e locali pubblici in genere;
- magazzini, impianti industriali;
- navi, aerei e mezzi di trasporto in genere;
- depositi di rifiuti, discariche etc.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

K-OTHRINE® FLOW 7,5 si impiega alle seguenti dosi:

- 115-130 ml ogni 100 m² contro insetti volanti, cimici, pulci;
 - 165-200 ml ogni 100 m² contro blatte, formiche ed insetti striscianti in genere.
- Per l'impiego, le dosi suddette vanno diluite direttamente nei seguenti quantitativi d'acqua:
- 10 litri ogni 100 m² su superfici assorbenti (muri grezzi, etc.);
 - 4 litri ogni 100 m² su superfici non assorbenti (ceramica, grès, pitture lavabili, etc.).

La speciale formulazione in dispersione acquosa rende più agevole la preparazione della miscela e la sua distribuzione, aumenta la sicurezza d'impiego. Inoltre riunisce i vantaggi di praticità d'impiego delle formulazioni liquide tradizionali e di durata della protezione delle formulazioni in polvere bagnabile.

Distribuire la miscela con una pompa a bassa pressione, avendo cura di bagnare uniformemente tutte le superfici da disinfestare.

DA NON VENDERSI SFUSO

AVVERTENZE

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

- In caso di ingestione accidentale: sintomi gastroenterici (dolori epigastrici, nausea, vomito) da 10' a 1 ora dopo l'ingestione - sintomi sistemici (vertigini, cefalea, debolezza fino a ipersalivazione, miosi, febbre, palpazioni, oppressione toracica) - in casi gravi possono sopraggiungere disturbi neurologici (fascicolazioni muscolari degli arti, sonnolenza fino a coma e stato convulsivo).
- In caso di inalazione accidentale: le disestesie cutanee facciali transitorie (senza lesione cutanea) sono frequenti e appaiono per prime. Rari i sintomi di irritazione respiratoria. Sintomi sistemici e neurologici possono manifestarsi solo secondariamente fino a 48 ore dopo l'inalazione.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Cure di pronto soccorso

- in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;
- in caso di contatto oculare, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15';
- trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o antistaminiche;
- evitare l'esposizione alla luce viva;
- in caso di ingestione accidentale non provocare il vomito, evitare il raffreddamento del paziente, chiamare con urgenza un medico.



K-Othrine®

FLOW 7,5

INSETTICIDA

A lunga durata d'azione


**Insetticida piretroide
per uso civile**

a lunga durata d'azione
per la lotta contro gli insetti nocivi
e molesti in depositi, fabbricati
civili, industriali etc.

COMPOSIZIONE :

100 g di prodotto contengono:
Deltametrina 0,73 g (= 7,5 g/l).
Coformulanti q.b. a 100.

1Le



Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave)

- in caso di inalazione notevole di Deltametrina, è preferibile tenere sotto controllo il paziente per 48 h;
- in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare carbone attivo.

Trattamenti consigliati: Diazepam (per via i.v. lenta o intra-rettale) in caso di convulsioni e Atropina in caso di ipercolinergia.

Controindicazioni: stimolanti del sistema nervoso centrale.

Avvertenze: consultare un Centro Antiveneni.

Verificare sempre l'assenza di esposizione preliminare (nei giorni precedenti) o concomitante ad un organofosforico; alcuni infatti aumentano la tossicità della Deltametrina.

K-OTHRINE® FLOW 7,5

Composizione: 100 g di prodotto contengono: Deltametrina 0,73 g (= 7,5 g/l), coformulanti q.b. a 100.

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208** Contiene 1,2 Benzisotiazolin-3-one, 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one / 2-metil isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
- EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 MILANO - Tel. 02/3972.1

Presidio medico chirurgico - Registrazione n° 14035 del Ministero della Salute

Officina di produzione: Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia)

Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. - Marle-sur-Serre (Francia)

TAGLIA AUTORIZZATA: 1 L

Lotto n° del: vedi altra parte della confezione

Validità 4 anni.



ATTENZIONE



Bayer

® Marchio registrato Gruppo Bayer
IT06053334K - **ARTICLE 79014538**