D'ORTA S.p.A.
DAL 1937 LA DISINFESTAZIONE PROFESSIONALE

... dal 1937 operiamo con professionalità e nel rispetto dell'ambiente
Via Provinciale Pianura - Loc. S. Martino, 18 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel.: 0815264388 - Fax: 0815266177 - Sito web: www.dorta.it

BRODIF ABD PARAFFINATO

DERATTIZZANTE

Esca Rodenticida pronta all'uso in blocchi paraffinati
Per uso professionale

SCHEDA TECNICA

aggiornata in data: 22/03/2016

Autorizzazione biocida (PT 14 – Rodenticida) n° IT/2015/00289/MRP

Composizione

100 g di BRODIF ABD PARAFFINATO contengono:
- Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) 0,005 g
- Denatonio Benzoato 0,001 g
- Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche

BRODIF ABD PARAFFINATO è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente contro topi e ratti con una sola ingestione. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione permettendo il controllo dell'infestazione, senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. BRODIF ABD PARAFFINATO contiene una miscela ben bilanciata d'ingredienti di origine alimentare appetibili per i roditori; il suo contenuto in paraffina rende l'esca particolarmente resistente ed adatta al suo impiego in ambienti umidi. Il singolo blocco è dotato di un foro centrale per fissarlo agli appositi contenitori di sicurezza e a supporti fissi. BRODIF ABD PARAFFINATO può essere impiegato per derattizzazioni interne ed intorno agli edifici e nelle fognature.
BRODIF ABD PARAFFINATO contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini.

Istruzioni per l'uso

Luogo d'impiego:

BRODIF ABD PARAFFINATO può essere utilizzato per derattizzazioni all'interno ed intorno ad edifici civili e rurali (industrie, abitazioni, magazzini, cantine, ripostigli), nelle navi e fognature.

Modalità d'impiego:

Indossare guanti adatti (EN374) durante l'applicazione del prodotto. Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca deve essere inserita in un contenitore appropriato a prova di manomissione, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione da parte di bambini e di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Prima di posizionare i contenitori che includono l'esca, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc. Considerare sempre lo stato di resistenza della popolazione bersaglio nella scelta del rodenticida da utilizzare. Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (placebo).

Dosi d'impiego:

Per infestazioni da ratti (Rattus norvegicus), utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni. Per applicazione in tombini e fognature applicare fino a 200 g per ogni punto esca.
Per infestazioni da topi (Mus musculus), utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo tale distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni.
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. In ogni caso le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfestazione smaltire le esche residue secondo la normativa vigente. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 5 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori e smaltire le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Presentazione dell'esca:

Colore: blu
Blocchetto con foro centrale per il fissaggio da 20 g da usare tal quale

Taglie e confezioni di vendita

BRODIF ABD PARAFFINATO 20 g: Cartone da 15 kg.

Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.
I dati riportati, redatti sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo prodotto.