

# BROMABOX

**esca rodenticida pronta per l'uso**  
PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE

## SCHEDA TECNICA

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

|                                               |        |       |
|-----------------------------------------------|--------|-------|
| Bromadiolone ( N°CAS 28772-56-7 )             | g      | 0,005 |
| Denatonium Benzoate                           | g      | 0,001 |
| Coformulanti, sostanze appetibili e coloranti | q.b. a | g 100 |

PRODOTTO BIOCIDIA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00168/AUT

### Indicazioni di Pericolo

H360D Può nuocere al feto.

H372 Provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### Consigli di Prudenza

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P280 Indossare guanti.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501 Smaltire prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione.

### Contiene

3-[3-[4-(4-bromofenil)fenil]-3-idrossi-1-fenilpropil]-2-idrossicromen-4-one; bromadiolone.



PERICOLO

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.

SINTOMI: in seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina k possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.

TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico con un **centro antiveleni**.

CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Bromabox** è un'esca rodenticida pronto all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Bromadiolone, efficace contro il topolino domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

**Bromabox** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

**Bromabox** può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

### ISTRUZIONI, MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare i guanti adatti. L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione accidentale di bambini e specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Quando il prodotto viene usato in vaschette monodose, al momento del posizionamento tagliare la pellicola protettiva superiore. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza.

- Per i ratti usare 60 - 100 g per punto esca. Posizionare punti esca distanziati di 10 m e ridurli a 5 per infestazione maggiori. Non muovere o disturbare i punti esca per diversi giorni dopo aver piazzato le esche. Se non vengono notati segni di attività dopo 7-10 giorni, muovere le esche in un area di maggiore attività.
- Per topi usare 20-40 g per punto esca. Piazzare i punti esca ogni 5 metri riducendoli a 2 m in caso di infestazioni maggiori. I topi sono molto curiosi e può essere utile all'efficacia del trattamento muovere le esche ogni 2-3 giorni quando i punti esca vengono ispezionati e/o ricaricati.

La morte avviene dopo alcuni giorni dalla ingestione, tipicamente 4-10.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. All'a fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### AVVERTENZE

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveleni. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.