# BRODIM PASTA

**BIOCIDA**

Esca topicida-ratticida pronta all'uso in formulazione pasta fresca a base di Brodifacoum, con Denatonio Benzoato.

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

| | | |
|---|---|---|
| Brodifacoum puro | g | 0,005 |
| Denatonio benzoato puro | g | 0,001 |
| Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a | g | 100 |

## *IL PRINCIPIO ATTIVO*

Il Brodifacoum è fra i più recenti membri della famiglia dei rodenticidi anticoagulanti della seconda generazione, efficacissimo contro tutti i tipi di roditori (*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus*, ecc.), compresi quelli resistenti agli altri anticoagulanti.

Come per gli altri prodotti appartenenti alla classe dei rodenticidi anticoagulanti, la morte del roditore avviene per emorragia interna dopo 4-5 giorni dall'ingestione delle esche e perciò non suscitando diffidenza nei riguardi del prodotto da parte dei consimili. Anche qualora il roditore abbia ingerito una dose di principio attivo molto superiore a quella letale, la morte non viene anticipata.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, BRODIM PASTA contiene Denatonio Benzoato che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, perciò, se ne cibano avidamente.

## *LE CARATTERISTICHE*

BRODIM PASTA è efficace contro diversi tipi di roditori: topolini domestici (*Mus musculus*), ratti grigi (*Rattus norvegicus*), ratti neri (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione.

## *L'APPLICAZIONE*

BRODIM PASTA può essere usato all'interno e intorno gli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Impiegare le esche tal quali senza privarle dell'involucro, nei luoghi maggiormente frequentati dai roditori, avendo cura di collocarle all'interno di appositi contenitori robusti e richiudibili.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo iloro percorsi e nei posti di maggior presenza.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Le dosi consigliate sono:

- Topolino domestico: 40 g di esca x 100 mq
- Ratto grigio e ratto nero: 60-100 g di esca x 100 mq

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste.

## *LA FORMULAZIONE*

BRODIM PASTA è un topicida in pasta fresca in bustine da 20 g contenute nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

BRODIM PASTA viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

## *LE INDICAZIONI*

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Da non impiegarsi in agricoltura.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14). Per uso professionale.
Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2014/00214AUT

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - BRODIM PASTA è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.

SCT-00369