SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

TAC SPRAY

Registrazione del Ministero della Salute n. 16548

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO A BASE DI DELTAMETRINA ED ESBIOTRINA AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE - PER USO DOMESTICO E CIVILE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Deltametrina tec.	0,0225 g
Esbiotrina tec.	0,3 g
Piperonilbutossido tec.	1,665 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Caratteristiche

TAC SPRAY è un insetticida pronto all'uso a base di piretroidi sintetici, sinergizzati, dotati di un'azione abbattente rapida e persistente.

Campo d'applicazione

TAC SPRAY è utilissimo per combattere sia zanzare (*Culex pipiens, Anohpeles* spp.), zanzara tigre (*Aedes alobopictus*), mosche (*Musca domestica*) ed altri insetti volanti, sia insetti striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d'argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni e cimici dei letti. TAC SPRAY trova utile impiego negli ambienti domestici dove viene garantita la massima sicurezza nei confronti della persona e degli animali d'affezione. TAC SPRAY può essere efficacemente impiegato in: Magazzini, depositi di merci alimentari. Ambienti industriali in genere. Abitazioni, Cantine, Scuole, Asili, Palestre, Spogliatoi, Caserme, Cinema, Teatri, Sale d'attesa di stazioni ed aeroporti, Mezzi di trasporto. Villaggi turistici, Campeggi. Mense, Alberghi, Ristoranti. Ospedali, Case di cura e di riposo e in quegli ambienti dove sia necessaria una disinfestazione.

Dosi e modalità d'impiego

TAC SPRAY è destinato principalmente all'impiego in ambienti chiusi.

Insetti volanti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici da una distanza di circa 25 cm, lasciando agire per circa mezz'ora e, quindi, aerare il locale. Per ottenere un'azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro o dalle altre superfici con cui hanno maggiormente contatto tali insetti (tapparelle, finestre, davanzali, tappezzerie).

Insetti striscianti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici, nelle crepe e fessure dei muri lasciando agire per circa mezz'ora e, quindi, aerare il locale. Per ottenere un'azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro o dalle superfici di maggior passaggio (battiscopa, davanzali, sottolavelli, strutture infestate). Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone.

Per la confezione da 150 ml (autosvuotante): allontanare persone ed animali dall'ambiente da trattare e, dopo aver chiuso porte e finestre, posizionare l'erogatore verticalmente al centro dell'ambiente. Premere la valvola erogatrice e uscire dal locale. L'erogazione si completa in 2-3 minuti circa. Dopo circa 30-60 minuti aerare gli ambienti trattati. La bombola da 150 ml deve essere utilizzata in ambienti da circa 45 mq per trattamenti contro gli insetti striscianti e fino a 75-100 mq contro gli insetti volanti. Non utilizzare per ambienti inferiori ai 30 mq. Se devono essere trattati ambienti con superfici e cubatura superiori, aumentare proporzionalmente il numero degli erogatori suddividendoli in più punti. Ripetere il trattamento, se necessario, in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.

Confezioni

- TAC SPRAY Bombole da 500 ml in scatole da 12 pz — COD 1-2-400-500X12
- TAC SPRAY Bombole da 500 ml in scatole da 12 pz — COD 1-2-400-500X12-CA
- TAC SPRAY AUTOSVUOTANTE Bombole da 150 ml in scatole da 24 pz — COD 1-2-400-150X24

bleuline s.r.l.
via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · Tel. +39 0543 754430 · Fax +39 0543 754162
e-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · P. IVA 03168170409